

pedrini keller zahnÄrzte

Parodontaltherapie mit Antibiotika  
Amoxicillin und Metronidazol

## Patienteninformation zur Einnahme von Antibiotika Amoxicillin und Metronidazol

- Halten Sie die von uns verordnete Dosierung und Behandlungsdauer ein.
- Nehmen Sie das Medikament immer zur gleichen Tageszeit ein.
- Das Antibiotikum können Sie mit oder nach dem Essen einnehmen.
- Während der Therapie und mindestens einen Tag danach sollten Sie auf alkoholische Getränke verzichten.
- Mögliche Nebenwirkungen sind:  
Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall.

Bei Fragen oder Problemen dürfen Sie uns gerne anrufen.

## Dosierung:

Tageszeit:	Medikamenten Dosierung:
Morgen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Tablette 500mg Amoxicillin</li><li>• 1 Tablette 500mg Metronidazol</li></ul>
Mittag:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Tablette 500mg Amoxicillin</li><li>• 1 Tablette 500mg Metronidazol</li></ul>
Abend:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Tablette 500mg Amoxicillin</li><li>• 1 Tablette 500mg Metronidazol</li></ul>

Für Ihre Gesundheit!

Ihr pedrinikeller-Team