

pedrini keller zahnÄrzte

Parodontaltherapie mit Antibiotika
Dalacin C und Metronidazol

Patienteninformation zur Einnahme von Antibiotika Dalacin C und Metronidazol

- Halten Sie die von uns verordnete Dosierung und Behandlungsdauer ein.
- Nehmen Sie das Medikament immer zur gleichen Tageszeit ein.
- Das Antibiotikum können Sie mit oder nach dem Essen einnehmen.
- Während der Therapie und mindestens einen Tag danach sollten Sie auf alkoholische Getränke verzichten.
- Mögliche Nebenwirkungen sind:
Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall.

Bei Fragen oder Problemen dürfen Sie uns gerne anrufen.

Dosierung:

Tageszeit:	Medikamenten Dosierung:
Morgen:	<ul style="list-style-type: none">• 1 Tablette 300mg Dalacin C• 1 Tablette 500mg Metronidazol
Mittag:	<ul style="list-style-type: none">• 1 Tablette 500mg Metronidazol
Abend:	<ul style="list-style-type: none">• 1 Tablette 300mg Dalacin C• 1 Tablette 500mg Metronidazol

Für Ihre Gesundheit!

Ihr pedrinikeller-Team